



Gut **vorbereitet** zu Ihrem Stress-Herz-MRT.

Wir untersuchen die Durchblutung Ihres Herzmuskels in Ruhe und unter Belastung – ohne Röntgenstrahlung. Die Belastung löst ein Medikament aus (Regadenoson).

VOR DER UNTERSUCHUNG

✓ 12 Stunden vorher: kein Koffein

Kein Kaffee (auch nicht entkoffeiniert), Schwarz- oder Grüntee, keine Cola, Energydrinks, Kakao oder Schokolade. Koffein hebt die Wirkung des Stress-Medikaments auf – **die Untersuchung wäre wertlos.**

✓ Medikamente

- Keine **koffeinhaltigen** (12 h) oder **theophyllinhaltigen Medikamente** (24 h, z. B. manche Asthmamittel) – bitte vorab mit uns klären.
- **Nitrate oder Molsidomin** (z. B. Nitrolingual, Isoket, Elantan, Pentalong, Corvaton) möglichst 24 Stunden vorher pausieren – **nur nach Rücksprache** mit uns oder Ihrem Kardiologen.
- Alle übrigen Medikamente wie gewohnt einnehmen.

✓ 4 Stunden vorher nichts essen

Klares Wasser ist erlaubt. Bitte nicht rauchen.

✓ Mitbringen

Überweisung, Versichertenkarte, aktuelle **Medikamentenliste** und ggf. Implantat- oder Schrittmacherausweis.

KLAR. PRÄZISE. PERSÖNLICH.

Radiologie Würzburg · Würzburg · Höchberg · Bad Mergentheim

Am Untersuchungstag.



Ablauf und Dauer

Über **einen venösen Zugang** erhalten Sie MRT-Kontrastmittel und das Stress-Medikament; EKG, Blutdruck und Puls werden durchgehend überwacht. Die Untersuchung dauert **30 bis 60 Minuten**, dazu kommen Vorbereitung und kurze Nachbeobachtung.



Während und nach der Belastung

Herzklopfen, Wärme, Kopfdruck, Atemnot oder Brustdruck sind kurz normal und klingen meist binnen 30 Minuten ab. **Unser Team ist die ganze Zeit bei Ihnen** – melden Sie Beschwerden sofort. Danach normal essen und trinken; bei Schwindel vor dem Autofahren kurz warten.



Ort: Eichhornstraße 21, 97070 Würzburg

Bitte sagen Sie uns vorher unbedingt Bescheid bei ...

- schwerem Asthma oder COPD
- AV-Block oder sehr langsamem Puls (ohne Schrittmacher)
- frischem Herzinfarkt, Brustschmerz in Ruhe
- sehr niedrigem oder unkontrolliert hohem Blutdruck
- früheren Krampfanfällen
- Allergie gegen Gadolinium oder MRT-Kontrastmittel
- Schwangerschaft oder Stillzeit
- nicht MRT-tauglichem Implantat oder ausgeprägter Platzangst

*Ausführliche Aufklärung: vorab über unsere **digitalen Patientenformulare** und im ärztlichen Gespräch.*

Termine & Fragen:
0931 41799-0

radiologie-wuerzburg.de



Diese Info
zum Download

KLAR. PRÄZISE. PERSÖNLICH.